瘤、肌肉量、体温、性别及蛋白摄入量等因素的影响。Cys-C 可以自由通过肾小球滤过膜,并在近曲小管被重吸收和降解,外周血水平主要决定于 GFR,因此被认为是反映 GFR 较理想的内源性标志物^[6]。本研究结果发现,T2DM 患者血清 Cys-C 水平随肾损伤程度的加重逐渐升高,与对照组、单纯 DM 组相比,早期 DN 组血清 Cys-C 水平已有明显升高($P < 0.05$)。Cys-C 的相对分子质量大于 CR,且生成速度和外周血浓度的稳定性优于 CR,不受其他病理及生理因素的影响,其外周血浓度与 GFR 的线性关系也优于 CR,因此血清 Cys-C 水平能够更为敏感地反映肾小球滤过膜通透性的早期变化。当肾小球出现轻微损伤时,血清 Cys-C 水平即可升高,并且随着病情的加重而逐渐升高^[7]。本研究中,早期 DN 组血清 Cys-C 水平已高于对照组($P < 0.05$),而 BUN、CR 水平仍处于正常范围内,当 DN 逐渐加重到临床 DN 阶段,BUN、CR 水平才明显升高,因此 BUN、CR 反映肾功能损伤的敏感性和特异性远不如 Cys-C。这是由于肾脏具有强大的储备能力和代偿能力,在肾小球损伤早期或轻度损伤时,外周血 BUN、CR 水平改变不明显。与此同时,BUN、CR 水平易受食物、肌肉含量等多种因素的干扰,不能准确反映肾功能的变化。因此,利用血清 Cys-C 诊断 DN 早期肾损伤具有明显的优势。

目前, DN 早期诊断主要依赖于 UAER 检测,因此尿 mALB 是发现早期肾损伤的重要标志物^[8]。清蛋白是外周血中所占比例最大的低分子量蛋白质,也是可从肾小球滤过膜通过的最小蛋白质,滤过的清蛋白在近曲小管几乎被完全吸收。正常情况下,UAER 水平为 30 mg/24 h。当 DM 患者肾小球滤过膜受损,表面电荷发生改变导致尿-尿屏障受损时,mALB 滤过量大于近曲小管的重吸收量,造成尿 mALB 水平增高,UAER 升高至 30~300 mg/24 h,说明患者已经发展为早期 DN;如果此时进行有效的干预和治疗,肾小球功能可被及时修复,尿 mALB 水平恢复至正常,早期 DN 的临床症状也可得以逆转,防止向临床蛋白尿阶段发展。当 UAER 水平持续高于 300 mg/24 h 时,可诊断为 DN。因此,尿 mALB 也是反映肾小球受损的敏感标志物。本研究显示,DM 患者尿 mALB 水平随着肾损伤程度的加重而升高,并且与血清 Cys-C 水平具有良好的相关性($P < 0.05$),说明二者对 DM 早期肾损伤的诊断具有重要的临床价值。然而,尿 mALB 检测有其自身的局限性,

• 临床研究 •

检测结果易受泌尿系统感染、酮症状态、妇女月经期、运动及血压等肾内及肾外因素的影响,特异性稍差^[9]。因此,对血清 Cys-C 和尿 mALB 进行联合检测可有效提高早期 DN 的诊断率。本研究中,血清 Cys-C、尿 mALB 单项检测的总阳性率分别为 68.8% 和 61.3%,而二者联合检测的总阳性率为 85.0%,联合检测的总阳性率高于单项检测($P < 0.05$),说明联合检测可提高诊断灵敏度,能够为 DN 的预防与早期诊治提供参考。此外,随着 DM 患者病程的延长,血清 Cys-C 和尿 mALB 阳性率逐渐升高,说明二者能较好地反映病情的严重程度,不仅是 DM 早期肾损伤的敏感标志物,也是 DN 病情监测及预后评估等方面的重要观察指标。

综上所述,血清 Cys-C 和尿 mALB 是诊断 T2DM 早期肾损伤的重要标志物,二者联合检测的诊断效能更高,对 DM 早期肾损伤的诊断具有极其重要的临床应用价值。

参考文献

- [1] 李树法,欧亚萍,张喜,等.贵阳市糖尿病住院患者死亡原因分析[J].中国老年学杂志,2011,31(12):2325-2327.
- [2] 贾建民,孟菁菁.尿微量白蛋白与血清胱抑素 C 的联合检测在糖尿病肾病早期诊断中的临床意义[J].中国卫生检验杂志,2010,20(9):2210-2211.
- [3] 徐静.血清胱抑素 C 及尿微量白蛋白联合检测对早期糖尿病肾损伤的诊断价值[J].中国实用医药,2012,7(8):86-87.
- [4] 郝建军.血清胱抑素 C、尿微量白蛋白在糖尿病早期肾损害诊断中的应用价值评估[J].实验与检验医学,2011,29(2):171-173.
- [5] 李玉艳,杨振坤.胱抑素 C 在临床中的应用进展[J].国际检验医学杂志,2006,27(9):812.
- [6] 李海霞,徐国宾.胱氨酸蛋白酶抑制剂 C 与肌酐在评价糖尿病患者肾小球滤过功能中的比较[J].中华检验医学,2002,28(6):602.
- [7] 陈玮,段贞.糖尿病肾病早期监测血清胱抑素 C 的临床意义[J].实用预防医学,2009,16(1):31.
- [8] 陈燕,赵敏,张家红,等.尿微量白蛋白检查对糖尿病早期肾损伤的诊断价值[J].中华检验医学杂志,2003,26(9):262-264.
- [9] 吴敏敢,吴坤利.胱抑素 C 和尿微量白蛋白联合检测对诊断糖尿病早期肾损伤的价值[J].中国医药指南,2010,8(25):133-134.

(收稿日期:2015-04-01)

双糖铁试验改良安瓿法试验研究

刘 刚,魏莲花[△],邹凤梅,杨永清

(甘肃省人民医院检验中心,甘肃兰州 730000)

摘要:目的 对鉴定细菌常用的克氏双糖铁琼脂(KIA)培养基试管法进行改良,为实验室鉴定肠杆菌科细菌提供方便、准确的鉴定方法。方法 配制试剂,分装至安瓿管中,高压灭菌备用;对标准菌株、质控菌株、临床分离菌株共 534 株进行试验,与试管法进行对比,根据常规方法判断结果。结果 安瓿法与试管法结果完全一致。结论 用安瓿法进行 KIA 试验,简单方便,结果准确,试剂用量小,且能室温长期保存,该方法可以推广应用。

关键词:细菌鉴定; 双糖铁试验; 安瓿法

DOI:10.3969/j.issn.1673-4130.2015.18.046

文献标识码:A

文章编号:1673-4130(2015)18-2726-04

无论实验室有无微生物自动鉴定仪,克氏双糖铁琼脂(KIA)培养基是不可或缺的,可用于肠杆菌和非发酵菌的初步鉴别。KIA 可用于观察细菌能否发酵葡萄糖、乳糖及分解蛋

白质产生硫化氢,尤其适用于肠杆菌科细菌的鉴定^[1-3]。一般实验室常采用试管法进行^[2],试管法试剂用量大,配制烦琐,冰箱贮存占位面积大,实际应用十分不便。为了克服这些不足,

[△] 通讯作者,E-mail:weilianhua0199@sina.com。

本研究对试管法进行了改良,研制成安瓿法,可以室温保存,实际应用效果良好,现报道如下。

1 材料与方

1.1 菌株来源 甘肃省人民医院检验中心微生物实验室从 2005 年开始分离自血液、气管抽出液、痰液、烧伤创面等临床标本中的菌株约 1 000 株。选择其中生物学特性典型的肠杆菌科细菌 509 株用于本研究,包括大肠埃希菌 82 株、阴沟肠杆菌 156 株、肺炎克雷伯菌 83 株、弗劳地枸橼酸盐杆菌 20 株、产气肠杆菌 12 株、奇异变形杆菌 10 株、摩根摩根菌 8 株、鼠伤寒沙门菌 6 株、聚团多源菌 5 株、异型枸橼酸杆菌 4 株、产酸克雷伯菌 4 株、坂歧肠杆菌 3 株;以及痢疾志贺菌、福氏志贺菌、鲍氏志贺菌、普通变形杆菌、潘尼变形杆菌、黏质沙雷菌、小肠结肠炎耶尔森菌,各 2 株;蜂房哈夫尼菌、臭鼻克雷伯菌,各 1 株。

1.2 仪器与试剂 2 mL 安瓿(重庆北碚玻璃仪器厂),血琼脂基础及 KIA 培养基(英国 OXOID 公司),API-20E 鉴定卡及 VITEK-32 全自动微生物鉴定及药物敏感试验分析系统(法国生物梅里埃)。标准菌株:大肠埃希菌 ATCC25922、肺炎克雷伯菌 ATCC700603、阴沟肠杆菌 ATCC029M 均购自中国药品生物鉴定所。质控菌株:弗劳地枸橼酸杆菌(MM2503),异型枸橼酸杆菌(MM2208、MM2716),大肠埃希菌(MM2201、MM2313、MM2405、MM2503、MM2512),大肠埃希菌 O₁₅₇:H₇(MM2610),福氏志贺菌(MM2515),肺炎克雷伯菌(MM2314、MM2708),产酸克雷伯菌(MM2202、MM2403),臭鼻克雷伯菌(MM2216),奇异变形杆菌(MM2315),普通变形杆菌(MM2511),猪霍乱沙门菌(MM2213),B 群沙门菌(MM2603)及鼠伤寒沙门菌(MM2209)为香港医管局质控菌株,黏质沙雷菌(MM2302)与潘氏变形杆菌(WHO9001)为世界卫生组织质控菌株。

1.3 方法

1.3.1 菌株复活及鉴定 打开菌种管,分别加入 0.5 mL 肉汤,使其充分溶解,吸取 1~2 滴菌液至血琼脂平板,分段划线。将接种好的平板置于 35 °C 环境,孵育 24 h,用常规方法分离。涂片、染色镜检,采用试管法、API-20E 鉴定卡或 VITEK-32 全自动微生物鉴定及药物敏感试验分析系统鉴定。

1.3.2 传统法(试管法) 配制 KIA,加 4 mL 于 12 mm×150 mm 试管中^[2],加盖硅胶塞,115 °C 10 磅,高压灭菌 15 min。灭菌后,立即取出摆成高层斜面(确保高度为 3 cm)。冷却后,装塑料袋扎口,4 °C 冰箱保存。使用前放置室温 30 min^[4],用接种针挑取孵育 24 h 的上述各种细菌,接种于培养基底层穿刺、斜面上划线接种,置 35 °C 培养,结果观察不能小于 18 h,不

能大于 24 h^[1-2]。

1.3.3 安瓿法 配制 KIA,取 1.5 mL 加入 2 mL 安瓿中,汽油酒精喷灯拉丝封口^[5]。115 °C 10 磅,高压灭菌 15 min。灭菌后,立即取出摆成高层斜面。冷却后,室温保存。用小砂轮将安瓿颈处据开,接种观察结果同传统法。

1.4 结果判断 参照文献^[2]。

1.4.1 仅发酵葡萄糖 斜面:碱性反应,红色;高层(底部):酸性反应,黄色。若同时产生硫化氢(H₂S)气体,黑色沉淀可掩盖高层酸性反应,但要记录高层产酸。

1.4.2 葡萄糖和乳糖都发酵 斜面:酸性反应,黄色;高层:酸性反应,黄色。如果因 H₂S 产生在高层观察不到酸性反应,同样要记录高层产酸。

1.4.3 葡萄糖和乳糖均不发酵 斜面:碱性反应,红色;高层:需氧菌不生长,颜色无变化,与接种的培养基颜色相同或为橙红色。

1.4.4 产气菌 产二氧化碳(CO₂)和氢气(H₂)。可通过下述征象之一来证明气体产生:在培养基内有单个气泡;在培养基内有多个气泡;培养基裂开;培养基由底部全部上移,在底部有一明显的空白区;在试管的一侧培养基出现缺口。

1.4.5 H₂S 产生 通过以下几点证明黑色沉淀(硫化亚铁)的存在:黑色蔓延整个高层并掩盖酸性;接近高层顶部呈现一黑色环;黑色沉淀物散布整个高层。当判定 KIA 结果时,上述反应的各种方式可同时出现,应记录所观察到的全部结果。

2 结 果

2.1 KIA 试管法与改良安瓿法结果对比 KIA 斜面试管法显示:1 号管底层葡萄糖阳性,上层乳糖阴性;2 号管底层葡萄糖阳性,上层乳糖阴性,H₂S 阳性;3 号管底层葡萄糖阳性,产气,上层乳糖阳性;4 号管 H₂S 强阳性,见图 1(见《国际检验医学杂志》网站首页“论文附件”)。KIA 斜面改良安瓿法显示:1 号管为成品培养基;2 号管底层葡萄糖阳性,上层乳糖阳性;3 号管底层葡萄糖阳性,产气,上层乳糖阴性,见图 2(见《国际检验医学杂志》网站首页“论文附件”)。图 3(见《国际检验医学杂志》网站首页“论文附件”)显示:1 号管为成品培养基;2 号管底层葡萄糖阳性,产气,上层乳糖阴性,H₂S 强阳性。图 4(见《国际检验医学杂志》网站首页“论文附件”)显示:细菌产气使培养基裂开。KIA 试管法与改良安瓿法结果对比颜色反应一致。

2.2 标准菌株和质控菌株 KIA 传统试管法与安瓿法结果 见表 1。

2.3 509 株试验菌 KIA 传统试管法与安瓿法结果 见表 2。

表 1 标准菌株和质控菌株细菌 KIA 斜面试验结果

细菌名称	株数 (n)	KIA 斜面							
		斜面		底层		H ₂ S		气体	
		传统试管法	改良安瓿法	传统试管法	改良安瓿法	传统试管法	改良安瓿法	传统试管法	改良安瓿法
ATCC25922 大肠埃希菌	1	A	A	A	A	-	-	+	+
ATCC700603 肺炎克雷伯菌	1	A	A	A	A	-	-	+	+
ATCC029M 阴沟肠杆菌	1	A	A	A	A	-	-	+	+
弗劳地枸橼酸杆菌	1	A	A	A	A	+	+	+	+
异型枸橼酸杆菌	2	A	A	A	A	-	-	+	+
大肠埃希菌	5	A	A	A	A	-	-	+	+
大肠埃希菌 O ₁₅₇ :H ₇	1	A	A	A	A	-	-	+	+

续表 1 标准菌株和质控菌株细菌 KIA 斜面试验结果

细菌名称	株数 (n)	KIA 斜面							
		斜面		底层		H ₂ S		气体	
		传统试管法	改良安瓿法	传统试管法	改良安瓿法	传统试管法	改良安瓿法	传统试管法	改良安瓿法
福氏志贺菌	1	K	K	A	A	-	-	-	-
肺炎克雷伯菌	2	A	A	A	A	-	-	+	+
产酸克雷伯菌	2	A	A	A	A	-	-	+	+
臭鼻克雷伯菌	1	K	K	A	A	-	-	-	-
奇异变形杆菌	1	K	K	A	A	+	+	+	+
普通变形杆菌	1	K	K	A	A	+	+	+	+
猪霍乱沙门菌	1	K	K	A	A	+	+	+	+
B 群沙门菌	1	K	K	A	A	+	+	+	+
鼠伤寒沙门菌	1	K	K	A	A	+	+	+	+
黏质沙雷菌	1	K	K	A	A	-	-	+	+
潘氏变形杆菌	1	K	K	A	A	-	-	-	-

A:产酸;K:产碱;+:阳性;-:阴性。

表 2 509 株肠杆菌科细菌 KIA 斜面试验结果

细菌名称	株数(n)	KIA 斜面							
		斜面		底层		H ₂ S		气体	
		传统试管法	改良安瓿法	传统试管法	改良安瓿法	传统试管法	改良安瓿法	传统试管法	改良安瓿法
弗劳地枸橼酸杆菌	20	A	A	A	A	+	+	+	+
异型枸橼酸杆菌	4	A	A	A	A	-	-	+	+
产气肠杆菌	12	A	A	A	A	-	-	+	+
阴沟肠杆菌	156	A	A	A	A	-	-	+	+
聚团肠杆菌	5	K	K	A	A	-	-	-	-
坂崎肠杆菌	3	A	A	A	A	-	-	+	+
大肠埃希菌	182	A	A	A	A	-	-	+	+
痢疾志贺菌	2	K	K	A	A	-	-	-	-
福氏志贺菌	2	K	K	A	A	-	-	-	-
鲍氏志贺菌	2	K	K	A	A	-	-	-	-
蜂房哈夫尼菌	1	K	K	A	A	-	-	+	+
肺炎克雷伯菌	83	A	A	A	A	-	-	+	+
产酸克雷伯菌	4	A	A	A	A	-	-	+	+
臭鼻克雷伯菌	1	K	K	A	A	-	-	-	-
摩根摩根菌	10	K	K	A	A	-	-	+	+
奇异变形杆菌	8	K	K	A	A	+	+	+	+
普通变形杆菌	2	K	K	A	A	+	+	+	+
潘尼变形杆菌	2	K	K	A	A	-	-	-	-
鼠伤寒沙门菌	6	K	K	A	A	+	+	-	-
黏质沙雷菌	2	K	K	A	A	-	-	-	-
小肠结肠炎耶尔森菌	2	K	K	A	A	-	-	-	-

A:产酸;K:产碱;+:阳性;-:阴性。

2.4 改良培养基储存期观察 分别于制备后半年及 1、2 年观察,培养基无干燥、变色、生长细菌等;接种相应质控菌株反应结果准确无误。

3 讨论

目前,引起人类感染的革兰阴性菌中,以肠杆菌科细菌引起的感染在临床位居首位,可引起临床各科室、人体各部位感染,近年来其感染率还在不断上升^[6]。革兰阴性菌菌落及镜下形态特征相似,鉴定过程繁琐,耗时长,易出错,常常耗费大量人力、物力,影响了检验结果的快速报告,远不能满足临床的迫

切需要。目前,细菌的准确鉴定技术已经成为微生物室的迫切需求,但由于方法的局限性等因素严重影响了细菌的快速鉴定,最终影响了细菌感染的及时诊治。

KIA 斜面试验是手工法肠杆菌科细菌鉴定中的关键试验,笔者在传统手工试管法的基础上,进行了改良研究,研制成安瓿法鉴定用培养基。通过试验对比,传统试管法与小样法结果完全相同,将为基层医院开展微生物检验、规范操作、提高培养阳性率等提供良好的手段。

综上所述,KIA 试验改良安瓿管试剂用量小,大大降低了

成本,且体积小,管口密封,可长期室温保存,比传统法具有优越性。

参考文献

[1] 李根生.干燥培养基的制造及使用[M].上海:上海科学技术文献出版社,1994:438-439.
 [2] 麦克法丁[英],林万明译.医学细菌生化试验鉴定手册[M].北京:人民卫生出版社,1985:141-147.
 [3] 张秀珍,朱德妹.临床微生物检验问与答[M].北京:人民卫生出版社,2008:136.
 [4] 叶应妩,王毓三,申子瑜.全国临床检验操作规程[M].3版.南京:

东南大学出版社,2006:372。
 [5] 邹凤梅,魏莲花,刘刚.安瓿法系列 O-F 糖醇管在非发酵菌鉴定中的应用研究[J].国际检验医学杂志,2011,32(3):371-372.
 [6] 胡付品,朱德妹,汪复,等.2013 年中国 CHINET 细菌耐药性监测[J].中国感染与化疗杂志,2014,14(5):365-374.

(收稿日期:2015-03-24)

• 临床研究 •

大肠埃希菌致新生儿感染分析

刘 婧,扈会整,任超杰,汪建军,吴斌艳,任伟娟,文 杏
 (陕西省核工业 215 医院,陕西咸阳 712000)

摘要:目的 分析新生儿感染大肠埃希菌的耐药性及治疗效果,探索预防措施。方法 选取 2011 年 1 月至 2013 年 12 月该院收治的大肠埃希菌感染新生儿 20 例,对分离的 20 株大肠埃希菌进行药物敏感性分析,并依据药物敏感性分析结果进行治疗。结果 20 株大肠埃希菌医院内感染占 80.0%;对多数第 3 代头孢类抗菌药物高度耐药,对第 4 代头孢类抗菌药物的敏感率达 70%以上,对碳青霉烯类亚胺培南、美洛培南高度敏感,敏感率均为 100.0%;超广谱 β-内酰胺酶(ESBLs)阳性率为 60.0%;经治疗后 16 例痊愈,4 例死亡,治愈率为 80.0%。结论 医院内感染是新生儿期大肠埃希菌感染的主要途径,病死率高,应引起临床高度重视,且临床还应严格消毒灭菌,减少侵袭性操作以减少医院内感染的发生。

关键词:大肠埃希菌; 新生儿; 交叉感染; 药物敏感性试验

DOI:10.3969/j.issn.1673-4130.2015.18.047

文献标识码:A

文章编号:1673-4130(2015)18-2729-02

大肠埃希菌寄居在人和动物的肠道,是肠道正常菌群,也是院内感染和社区感染的常见病原菌,可引起各部位感染,如尿路感染、菌血症、败血症、新生儿脑膜炎、胆囊炎、手术后腹腔感染及灼烧创面感染等^[1]。对此笔者就本院收治的 20 例大肠埃希菌感染新生儿进行分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2011 年 1 月至 2013 年 12 月本院收治的大肠埃希菌感染新生儿 20 例,男 7 例,女 13 例;日龄 4~26 d,平均(13.21±6.21)d;平均体质量(2 751.0±830.0)g,其中小于 1 500 g 者 3 例,1 500~2 500 g 者 4 例,大于 2 500 g 者 13 例;败血症 11 例(其中并发化脓性脑膜炎 3 例),肺炎 4 例(其中社区获得性肺炎 1 例、呼吸机相关性肺炎 3 例),皮肤脓肿 5 例,

1.2 方法 细菌鉴定使用法国生物梅里埃 VITEK 2 Compact 全自动细菌鉴定系统和专用鉴定卡(GN 卡),药敏试验采用纸片扩散法(K-B 法),根据美国临床实验室标准化协会(CLSI)规定的标准进行,结果解释标准参照 2012 年 CLSI 标准进行^[2]。超广谱 β-内酰胺酶(ESBLs)按 2010 年 CLSI 标准进行,用双纸片法确证试验检测 ESBLs,两组纸片为头孢他啶与头孢他啶/克拉维酸及头孢噻肟与头孢噻肟/克拉维酸,其两个药物中有任何一个在加入克拉维酸后,抑菌环直径与不加克拉维酸的抑菌环相比,增大值大于或等于 5 mm,判定为产 ESBLs^[3]。

2 结 果

2.1 菌种分布 20 例患儿共有血液、脑脊液、痰液、脓液标本 25 份检出大肠埃希氏菌,其中 3 例脑脊液与血液、2 例脓液与血液、1 例痰液与血液同时检出大肠埃希菌且药敏结果相同,视为同一菌株。20 株大肠埃希菌医院内感染 16 株,占

80.0%。分离标本中,共 11 份血液标本检出大肠埃希菌,为呼吸道、皮肤、消化道感染;5 份脑脊液标本检出大肠埃希菌,为脑脊膜膨出病变;4 份脓液标本检出大肠埃希菌,为呼吸道感染;5 份脓液标本检出大肠埃希菌,为皮肤表面感染。

2.2 药物敏感性试验结果 检出的大肠埃希菌中 60.0%的菌株为产 ESBLs 菌株,大肠埃希菌对常用抗菌药物的敏感率及耐药率,见表 1。

表 1 大肠埃希菌对常用抗菌药物的敏感率及耐药率(n=20,%)

抗菌药物	敏感率	耐药率
氨苄西林	0.0	100.0
头孢唑辛	20.0	80.0
头孢曲松	25.0	75.0
亚胺培南	100.0	0.0
哌拉西林/他唑巴坦	91.9	8.1
头孢吡肟	73.2	26.8
美罗培南	100.0	0.0
阿米卡星	81.1	18.9
左氧氟沙星	62.3	37.7
环丙沙星	56.8	43.2

2.3 治疗结果 20 例患儿均选用敏感的抗菌药物治疗,4 例死亡,为化脓性脑膜炎及败血症患儿,死亡原因均为严重的感染性休克;16 例痊愈,治愈率为 80%,其中选用头孢吡肟治疗 11 例,美洛培南治疗 5 例。