柱凝胶法卡式配血相合,盐水手工试管法配血相合,与 Jk^b 抗原阳性血液配血不相合,见表 5。

表 5 不同抗原分型配血结果

筛选血液标本号	抗原分型	微柱凝胶配血方法		盐水配血方法	
		主侧	次侧	主侧	次侧
01	Jk(a+b+)	2+	3+	/	/
02	Jk(a+b+)	2+	3+	/	/
03	Jk(a+b+)	2+	3+	/	/
04	Jk(a+b-)	-	2+	-	-
05	Jk(a+b-)	-	2+	-	-
06	Jk(a+b+)	2+	3+	/	/

/:无数据。

2.6 输血记录 输注 A 型悬浮红细胞 2 U,输注过程中及输注后均无不良输血反应发生,患者输注前血红蛋白为 74 g/L,输注后为 88 g/L。

3 小 结

Jk^a 抗体为 IgG 性质,能有效结合补体,体外反应微弱,不易检测出,但容易发生迟发性溶血反应,具有此类抗体的人在第 1 次输血时或妊娠时一般不发生输血反应,只有再次输血或妊娠刺激后产生"回忆"的输血反应^[3]。患者抗体鉴定结果为 IgG 类抗-Jk^b 抗体,而患者的分型结果却为 Jk^b 抗原阳性,两者相矛盾。因此对患者输注的血液进行 Kidd 系统抗原分型,4 月 27 日及 5 月 4 日血液标本均已废弃处理,5 月 7 日输入的血液中含有 Jk^b 阳性的血液,再次输血后,输注的血液中有 Jk^b 抗原阳性血液,且距此次输血时间间隔短,由此考虑因为患

• 个案与短篇 •

者输入含有 Jk^b 抗原的血液刺激患者体内产生抗体且近期输入的血液未消耗完全,导致患者红细胞抗原分型出现假阳性,出现弱凝集反应,由于残存量少而没有出现双群。患者标本与 Jk^b 抗原阴性的血液配血相合,而与 Jk^b 抗原阳性血液配血主侧不合,为患者筛选了 Jk^b 抗原阴性的血液,患者输入后数日内并未发生输血反应。

输血前不规则抗体筛查在输血前检测中越来越重要,微柱凝胶法和抗人球蛋白法提高了检测抗体的灵敏度。由于目前尚未对患者及献血者进行血型抗原分型,从而无法避免输血所导致的免疫性抗体的产生,才导致了本病例中抗体的产生。本病例中此抗体聚凝胺法容易漏检,微柱凝胶法相合。在日常工作中,当遇到新产生的抗体与输入的血液未代谢完全,而出现弱凝集或为明显的双群时,应该引起注意,避免分型不当导致输注不相合的血液引起输血反应,导致严重的后果。

参考文献

- [1] 谢众上,孟艳,赵雪俭. Kidd 血型系统及意义[J]. 国外医学:生理、病理科学与临床分册,2003,23(4):430-431.
- [2] 胡丽华. 临床输血检验[M]. 北京:中国医药科技出版社,2004:36-38.
- [3] 李元红. 微柱凝胶法筛检出不规则抗 Jk^a 抗体 1 例[J]. 医学理论与实践,2011,24(22):2721.

(收稿日期:2015-07-11)

2 574 名武警官兵 ABO 血型系统抗原分布调查分析

王李洁¹,刘风华¹,石文雅²

(1. 武警上海市总队医院检验科,上海 201103;2. 上海和睦家医院检验科,上海 200336)

DOI:10.3969/j.issn.1673-4130.2015.18.078

文献标识码:C

文章编号:1673-4130(2015)18-2773-02

武警部队的根本职能是保卫国家安全、维护社会稳定、保障人民群众安居乐业,平时主要担负执勤、处突、反恐等任务,战时配合人民解放军作战。调查武警部队官兵的血型分布情况,对建立及完善战备血液采供体系有重要的参考意义。为此,笔者对本市 2 574 名武警官兵 ABO 血型系统抗原分布进行调查分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取上海市武警官兵 2 574 名,年龄 18~50 岁,性别不限,排除血缘关系。肘部静脉采集乙二胺四乙酸二钾(EDTA-K₂)抗凝血,置于 4℃ 冰箱保存。

1.2 仪器与试剂 EDTA-K₂ 真空抗凝管为武汉致远医疗有限公司产品;抗-A 血清、抗-B 血清、ABO 反定型用红细胞及 Rh(D)抗血清(IgM)均为上海血液生物医药有限责任公司产品。

1.3 方法 血型血清学检测方法按文献[1-2]操作。

1.4 统计学处理 采用 SPSS19.0 统计软件进行数据处理与统计分析,计数资料以例数或百分率表示,采用 Bernstein 法及

其校正公式计算 ABO 基因频率^[3], χ^2 值进行 Hardy-Weinberg 吻合度测验资料可靠性,民族指数的计算方法参照文献[4]。

2 结 果

对 2 574 名官兵 ABO 血型抗原调查结果:A 型 798 名,B 型 810 名,O 型 720 名,AB 型 246 名。A、B、O 基因频率分别为 $p=0.2301$, $q=0.2332$, $r=0.5366$ 。民族指数为 0.9738。调查官兵的观察值与期望值差异无统计学意义($P>0.05$),资料可靠,ABO 血型系统表现型分布状况及基因频率相对稳定。见表 1。

表 1 官兵 ABO 血型抗原分布[n(%)]

血型	观察值	期望值
A	798(31.00)	772(30.00)
B	810(31.47)	784(30.47)
O	720(27.97)	741(28.79)
AB	246(9.56)	276(10.74)
合计	2 574(100.00)	2 574(100.00)

3 讨 论

血液是一种特殊物资,是现代战争和应对突发事件伤员治疗的必需品,对失血性伤病员实施早期输血救治具有特殊效果。预先建立卫勤保障血液储备机制,是降低伤亡率,提高战伤救治率的必然要求^[5-6]。在所有血型系统中,ABO 血型是最早发现也是临床输血中最重要的血型系统。此次调查本市武警官兵 ABO 血型抗原分布存在以下特征:ABO 血型表现型频率顺序从高到低依次为 B、A、O、AB 型,基因频率顺序为 $r > q > p$,民族指数为 0.973 8。根据相关数据,本市武警卫勤保障任务战备储血血型 A : B : O : AB 可参考 31 : 31 : 28 : 10,但由于突发事件或战争发生的时间、空间和造成的危害程度难以控制,可能在短时间内产生大批失血伤员,血液的需求量会极具增加,而 O 型红细胞在特殊情况下可作为万能供血者^[7]。因此,战备血液储备应适当提高 O 型红细胞的比例。

武警医院担负着武警部队遂行多样化的卫勤保障任务,具有突发性强、反应时间短、任务要求高、任务节奏快、应急需求量大等特点。在战时或突发事件条件下,很难在短时间内筹集大量血液,加之人员血型的不确定性,临时盲目采血还会造成大量血液的浪费。因此笔者对本市 2 574 名武警官兵进行 ABO 血型抗原分布调查研究,对医院完善战备血液采供与储

• 个案与短篇 •

存体系有重要的参考意义,对武警医院做好新时期军事斗争的卫勤保障工作具有积极的作用。

参考文献

- [1] 肖星甫. 输血技术手册[M]. 成都:四川科学技术出版社,1992: 494-505.
- [2] 吕鹏,王培华,李学铭,等. 最新输血技术学[M]. 北京:人民卫生出版社,1994:383-415.
- [3] 赵桐茂. 人类血型遗传学[M]. 北京:科学技术出版社,1987:212-374.
- [4] 赵桐茂. 估计 Rh 基因组合体频率的两种简易方法[J]. 遗传学报, 1979,6(2):193.
- [5] 栾建风,叶东,孙海,等. 关于战备血液储备的思考[J]. 人民军医, 2008,51(3):131.
- [6] 王全立,陈民才. 应急采供血方案的研究与思考[J]. 人民军医, 2008,51(3):133-134.
- [7] 高军,马印图,李振奇,等. 军队血站战备血液储备库的建立及特点[J]. 人民军医,2012,55(1):86-87.

(收稿日期:2015-06-28)

1 例转移癌胸腔积液的液基细胞学检测

王海英,赵黎明,姜薇薇,杨 玲

(成都军区昆明疗养院 478 疗区,四川成都 650307)

DOI:10.3969/j.issn.1673-4130.2015.18.079

文献标识码:C

文章编号:1673-4130(2015)18-2774-02

胸腔积液采用液基细胞学检测,其优点在于标本的收集为含抗凝剂的专用标本收集瓶,能及时固定标本,防止细胞退变,在处理制片过程中利用过滤技术祛除杂质成分,不丢失细胞,不破坏细胞形态,上机制片时利用重力自然沉淀原理,优先捕获病变细胞,保持某些腺细胞团特有的三维立体结构^[1-5]。

1 病例报告

患者,女,61 岁。主诉:10 年前无诱因出现咳嗽、咳痰、喘息,多次到当地医院或诊所输液治疗,效果不佳。本次于 20 d 前加重伴发热,夜间不能平睡。入院,查体体温 36.80 ℃,神清,咽部稍充血,双肺呼吸音稍粗,可闻及湿罗音;心率 80 次/分,律齐;腹平软,无压痛及反跳痛;双下肢无水肿;右侧胸腔有积液。B 超:肝、胆、脾、肾、膀胱均无异常。临床医生申请胸腔积液做脱落细胞检测,结果为未见异常细胞。病理室用液基细胞学检测,查见恶性细胞(转移癌细胞)。经巴氏染色后,其形态学特点为:细胞核大、畸形、染色深,浆量少,细胞散在分布。结合影像学 CT 检查,该患者确诊为肺癌。

2 讨 论

一方面,肿瘤胸膜转移使血管通透性增加,蛋白渗入胸腔正常组织液的量超过回收的量^[6];另一方面,肿瘤压迫或阻塞淋巴管,使淋巴液回流受阻或胸导管受阻,使肺和心肌产生的正常组织液不能回流或重吸收,从而在胸腔内形成胸腔积液^[7-8]。而癌症在转移的过程中,会有部分癌性细胞脱落至胸腔积液中^[9-10]。

胸腔积液标本传统检查的细胞涂片由于采用手工制片,使细胞涂片层厚薄不均匀,常导致细胞重叠,或受推片的机械损伤,使细胞结构不清晰,形态发生改变^[11-12]。同时因传统方法收集的标本内常混有大量红细胞和炎性细胞,容易掩盖阳性肿瘤细胞,存在一定的局限性和不确定性,易出现漏诊^[13]。胸腔积液采用液基细胞学检测,在病变细胞学数量、形态及背景清晰度上均明显优于传统涂片,从而提高肿瘤病变细胞的检出率,减少恶性肿瘤患者的漏诊率。

参考文献

- [1] 邢杞,王咏梅,王秉志. 液基细胞学在恶性胸腔积液检查中的价值[J]. 吉林医学,2013,34(28):5770-5771.
- [2] 黄荣,方先勇,朱立强. 液基细胞学对胸腔积液中腺癌诊断及鉴别诊断中的应用价值[J]. 2015,36(6):847-848.
- [3] 李峥嵘,李沛陵. 液基薄层细胞制片技术在胸腹水标本中的应用价值[J]. 2014,23(3):85-87.
- [4] 蒋康. 液基细胞学技术在胸腹水检验中的应用[J]. 四川医学, 2012,33(10):1823-1824.
- [5] 王萍,张秋凤,李香菊,等. 液基细胞学检测在非妇科细胞标本肿瘤细胞学诊断中的意义[J]. 中国医药导报,2007,4(23):101-102.
- [6] 廖美荣. 肺癌并液气胸的护理[J]. 现代医药卫生,2013,29(20): 3195-3196.
- [7] 程龙,辛华,卢万朋,等. 恶性胸腔积液误诊为结核性胸膜炎的原因分析[J]. 中国实验诊断学,2015,(4):668-669.